

milgamma® protekt

شعور بالوخز؟ حرقان؟
شعور بالتنميل؟
عالج هذا الآن!



معروف من
التلفزيون



ميلجاما® بروتكت
لعلاج تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب 1

مناسب لمرضى السكري

تلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب)

الشعور بالوخز، والحرقان، والشعور بالتنميل – عندما تطلق القدمان ناقوس الخطر هذا، فغالبًا ما يكون ذلك علامة على أن الأعصاب قد تعرضت للتلف. عندئذ يتحدث الأطباء عن اعتلال الأعصاب. تبدأ الأعراض، التي يسببها المرض، عادةً في القدمين. يمكن أن تصبح هذه الأعراض عذابًا في ليالي الأرق والحرمان من النوم وتكون مرهقة للغاية للأشخاص المصابين بها في حياتهم اليومية. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يقلل تلف الأعصاب من حساسية القدمين للألم أو الضغط أو درجة الحرارة. ويؤدي ذلك إلى خطر اكتشاف الإصابات بعد فوات الأوان والإصابة بالالتهاب.

غالبًا ما تحدث اعتلالات الأعصاب بشكل غير ملحوظ على مدار فترة طويلة. لذلك: كن حذرًا واتصل بطبيبك المعالج إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض.



الشعور بالوخز

الحرقان

الشعور بالتنميل


تلف الأعصاب نتيجة نقص فيتامين ب1

ما لا يعرفه الكثيرون: يمكن أن يكون نقص فيتامين ب1 سببًا لتلف الأعصاب؛ لأن فيتامين ب1 ضروري ولا غنى عنه لصحة الأعصاب. وإذا لم يتم تزويد الألياف العصبية الحساسة به بشكل كافٍ، فمن الممكن أن تحدث اضطرابات وظيفية خطيرة وتلف.

عامل الخطر مرض السكري

يعاني مرضى السكري في حد ذاتهم من مخاطر عالية للإصابة بتلف الأعصاب. لذلك يجب على مرضى السكري أن يتعاملوا بحذر شديد مع أقدامهم.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة الحاجة إلى فيتامين ب1 في الجسم. إلا أنه في الوقت نفسه يتم إخراج فيتامين ب1 بشكل متزايد في مرضى السكري، مما قد يؤدي إلى نقص خطير في فيتامين الأعصاب المهم. أظهرت دراسة أن تركيز فيتامين ب1 في بلازما الدم لمرضى السكري كان منخفضاً بمعدل 75% مقارنة بالأشخاص الأصحاء.¹ لذلك من المهم بشكل خاص لمرضى السكري تعويض نقص فيتامين ب1.



فيتامين ب 1 في التغذية

يوجد فيتامين ب 1 في العديد من الأطعمة، ولكن بكميات قليلة جدًا في الغالب. المصادر الجيدة لفيتامين ب 1 هي، على سبيل المثال، البذور أو لحم الخنزير أو البقوليات أو منتجات الحبوب الكاملة. إلا أنه يمكن أن يحدث فقدان كبير لفيتامين ب 1 أثناء تحضير الطعام؛ لأن فيتامين ب 1 قابل للذوبان في الماء وحساس للحرارة.²



وبذلك، لا يحصل حوالي 21% من الرجال و32% من النساء على الكمية اليومية الموصى بها يوميًا من فيتامين ب 1. بل حتى إنه في الفئة العمرية من 65 إلى 80 عامًا، ترتفع نسبة النساء اللواتي لا يحصلن على الكمية الموصى بها إلى 40%.³

يُبان وضع تزويد الجسم بفيتامين ب 1 في حالة مرضى السكري حرج بدرجة أكبر: فهنا، لا يمكن عادةً تغطية الحاجة المتزايدة إلى فيتامين ب 1 من خلال التغذية العادية. فقد أظهرت دراسة أيضًا أن مرضى السكري من النوع الثاني غالبًا ما يحصلون على فيتامين ب 1 في طعامهم بدرجة أقل من الأشخاص الأصحاء.⁴

مكافحة نقص فيتامين ب 1 بالبنفوتيامين!

من أجل تعويض نقص فيتامين ب 1 الموجود ولمواجهة تلف الأعصاب الناجم عن ذلك، يوصى باستخدام مستحضر مكمل من الصيدلية لمرضى السكري، على سبيل المثال ميلجاما® بروتكت المحتوي على المادة الفعالة الفريدة بنفوتيامين.

كيف يعمل ميلجاما® بروتكت؟

ميلجاما® بروتكت هو دواء مرخّص لعلاج تلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب1. وهو يحتوي على المادة الفعالة الفريدة بنفوتيامين.

البنفوتيامين هو سلف لفيتامين ب1، والذي يتم تحويله إلى شكل فيتامين نشط في الجسم. ونظرًا إلى الخصائص الخاصة التي يتمتع بنفوتيامين، فإنه يمكن للجسم امتصاصه بمعدل 5 مرات أفضل من فيتامين ب1 البسيط.⁵



يعوض ميلجاما® بروتكت نقص فيتامين ب1، ومن ثمّ يكافح سببًا محتملاً لتلف الأعصاب، الذي يُطلق عليه اعتلال الأعصاب. يمكن التخفيف من حدة الأعراض المزعجة، مثل الوخز والحرقان والشعور بالتنميل في القدمين.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في الموقع الإلكتروني:

www.milgamma.de

نصيحة: شاهد الفيديو التوضيحي

شاهد أيضًا مقطع الفيديو التوضيحي البسيط الخاص بنا على يوتيوب. ضع كلمة البحث «milgamma» أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

www.youtube.com/watch?v=p6tgQsiBBO4



اختيارك لعلاج تلف الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب 1



مرة واحدة
فقط
في اليوم

PZN 01528157 30 قرصًا مغلفًا
PZN 17414438 60 قرصًا مغلفًا
PZN 01529731 90 قرصًا مغلفًا



صنع في ألمانيا

مرضى السكري لديهم مخاطر متزايدة لنقص فيتامين ب 1¹

يمكن لميلجاما® بروتكت علاج نقص فيتامين ب 1
باعتباره سببًا لاعتلال الأعصاب

يمكن التخفيف من أعراض مثل الوخز والحرقان
والشعور بالتنميل في القدمين

مناسب لمرضى السكري، يمكن تحمله بصورة جيدة

يوصى به للاستخدام طويل الأمد*

جرعة كافية، قرص واحد فقط في اليوم

* أكثر من ثلاثة أسابيع على الأقل

- 1 Thornalley et al. High prevalence of low plasma thiamine concentration in diabetes linked to a marker of vascular disease, Diabetologia 2007, 50:2164-2170
2 Hahn, Ströhle, Wolters. Ernährung - Physiologische Grundlagen, Prävention, Therapie. 3. Auflage. WVG 2016.
3 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.
Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht, Teil 2, 2008.
4 Wong et al. Daily intake of thiamine correlates with the circulating level of endothelial progenitor cells and the endothelial function in patients with type II diabetes, Mol Nutr Food Res 2008;52(12):1421-7.
5 Schreeb et al. Comparative bioavailability of two vitamin B1 preparations: benfotiamin and thiamine mononitrate. Eur J Clin Pharmacol 1997, 52:319-320

ميلجاما® بروتكت

المادة الفعالة: بنفوتيامين. الاستخدامات: علاج الاعتلالات العصبية واضطرابات القلب والأوعية الدموية الناتجة عن نقص فيتامين ب 1. العلاج أو الوقاية من حالات نقص فيتامين ب 1 السريرية، إذا كان لا يمكن علاجها من الناحية التغذوية. للحصول على معلومات حول المخاطر والآثار الجانبية، اقرأ النشرة الداخلية واسأل طبيبك أو الصيدلي.

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen

